

CESOIA & RASTRELLO Coltivare carciofi

Inviato da Marista Urru
venerdì 03 aprile 2009

Normalmente i carciofi vengono su bene nelle stesse zone in cui prospera l'olivo, quindi : isole, Liguria, e centro - nord, mentre al Nord abbisognate di terreni che siano esposti a Sud e protetti dal freddo del Nord dalle pendici collinari. Come sempre è buona norma aver preparato già in inverno precedente l'impianto il terreno con terriccio organico ben maturo, poi la primavera successiva, aver spianato il terreno e pulito al meglio; alcuni vi aggiungono concime complesso ternario, 90 gr per metro quadrato, io dovendo occuparmi di un mio orticello amatoriale questa aggiunta me la sono sempre risparmiata.

Le piante le disporrete a 1 metro di distanza una dall'altra in file distanti sempre 1 metro una dall'altra. Tenete presente che dopo i primi tre anni circa, le piante produrranno meno teste, quindi dovete ogni anno sostituire le piante meno produttive.

I polloni così detti cardini li comperate ora in Novembre....

O li comperate appunto in Novembre oppure con un coltello affilato togliete i polloni dalle vostre piante di almeno 3 anni scegliendoli tra quelli di almeno 25 cm., ma questi cardini non va bene piantarli subito, come pure alcuni pretendono, vanno invece invasati in buon terriccio e tenuti in cassone freddo per tutto l'inverno, li interrerete in Aprile, mentre quelli prelevati in Aprile, ovviamente li potete piantar subito. In febbraio o comunque a fine gennaio spargete de buon terriccio ben fertilizzato o del letame attorno alle radici della pianta, serve anche a proteggerla, il primo anno è bene rinunciare ai fiori, si irrobustirà la pianta e vi produrrà teste più grosse l'anno prossimo. Il secondo e terzo anno scegliete quali fiori tenere, il criteri è questo: lasciate il centrale e i fiori in cima ai getti laterali, quindi le gemme che spuntano dai getti laterali vanno tolte man mano

RICETTE CON CARCIOFI : qui

Malattie e problemi del carciofo:

Lumache e chiocciole -

Grillo talpa -

Afidi -

Peronospora-

Rizottoniosi -

Virus

Fisiopatie

Raccolto

Settentrione/ da maggio giugno

Centro/ aprile, maggio

Meridione/ marzo - aprile

